

# Fullmina™ 60 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

**Composición química:**

	p/v
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid.....	60 %
Ingredientes inertes.....	40 %
Total.....	100 %

**Contiene:** 600 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.



**DAÑINO**

ANTÍDOTO: NO TIENE.

**DENSIDAD:** 1,19 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**FORMULADO POR:**

Dow AgroSciences de Colombia, S. A.

A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**MODERADAMENTE PELIGROSO**

# Fullmina™ 60 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

**Fullmina™ 60 SL**, es un herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Actúa por traslocación vía floema a lugares en donde hay mayor consumo de alimentos. La absorción también se efectúa por las raíces, transportándose por el floema hacia las zonas de mayor actividad metabólica.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Al aplicar **Fullmina™ 60 SL**, debe asegurarse que el equipo de aplicación y sus boquillas estén en buen estado, sin fugas y debidamente calibrado con agua. Utilice un equipo de aplicación que le asegure un buen cubrimiento de la superficie a aplicar. La aplicación de este producto puede realizarse con equipo terrestre, tracción mecánica, tipo parihuela y de mochila. El tipo de boquilla recomendable a usar es de abanico. El producto no ejerce efecto sobre el equipo, si se utiliza adecuadamente.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Con el tanque del equipo de aplicación a la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de **Fullmina™ 60 SL**, luego complete el agua faltante y agite continuamente para mantener la homogeneización. Utilice presión baja y aplíquelo cuando se tenga crecimiento activo de la maleza.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

Para: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

#### MALEZAS QUE CONTROLA:

Tomatillo, *Solanum americanum*. Malva, *Malva parviflora*. Cardo santo, *Argemone mexicana*. Diente de león, *Taraxacum officinale*. Ruibarbo, *Rumex crispus*. Churrystate, *Ipomoea* spp. Chile de perro, *Polygonum* sp. Lechugilla, *Sonchus oleraceus*. Acedera, *Oxalis corniculata*. Pelo de chino, *Cyperus tenuis*. Llantén, *Plantago major*. Apazote, *Chenopodium ambrosioides*. Verdolaga, *Portulaca oleracea*. Canutillo, *Commelina diffusa*. Bombillo, *Calceolaria mexicana*. Flor amarilla, *Melampodium perfoliatum*. Bledo, *Amaranthus* spp. Tomatillo, *Physalis angulata*. Mostaza, *Brassica campestris*. Añil, *Indigofera* spp. Zanahoria silvestre, *Daucus carota*. Veza silvestre, *Vicia* spp. Santa Lucía, *Ageratum conyzoides*. Rabanillo, *Raphanus raphanistrum*.

# MODERADAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

# Fullmina™ 60 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	4 L/ha (2.8 L/mz)	Después de la emergencia del cultivo (post-emergencia). Sobre las malezas ya germinadas. Se aplica dirigido, evitando rociar el cultivo.
Arroz <i>Oryza sativa</i>	1.2 - 1.8 L/ha (0.8 - 1.2 L/mz)	Aplicar entre las 4 a las 8 semanas de la emergencia del cultivo en arroz de secano; a las 8 semanas en arroz inundado. Puede mezclarse con propanil, utilizándose un volumen de caldo total de 100 a 270 litros por hectárea (70 a 90 litros por manzana). En aplicaciones aéreas, utilizar un volumen de caldo de 75 litros por hectárea (53 litros por manzana).
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>	1.2 - 2 L/ha (0.8 - 1.4 L/mz)	Después de la emergencia del cultivo, en aplicaciones dirigidas.
Maíz <i>Zea mays</i>	2.5 - 3 L/ha (1.75 - 2.1 L/mz)	Después de la emergencia del cultivo, aplicando cuando la planta tenga de 3 a 4 hojas verdaderas.
Pastos	2 - 3 L/ha (1.4 - 2.1 L/mz)	Aplicar cuando las malezas tengan entre 3 y 4 hojas verdaderas.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Cuando se aplica en pastos, dejar un período de al menos 60 días libre de pastoreo.

Para caña de azúcar, arroz, sorgo y maíz, se aplica únicamente en los primeros estadios del cultivo.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede ingresar a la plantación 24 horas después de la aplicación.

### FITOTOXICIDAD:

Puede ser fitotóxico a los cultivos recomendados si no se aplica según las indicaciones dadas en este panfleto, así como para los cultivos no recomendados.

### COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con otros herbicidas hormonales como Fluroxypyr y Picloram. Por ser soluble en agua, no tiene problemas de compatibilidad con otros herbicidas en forma de polvos mojables.

**MODERADAMENTE PELIGROSO**

# Fullmina™ 60 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación que se presentan son salivación, calambres, vómitos, diarrea, falta de coordinación muscular.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Llamar inmediatamente a un centro para control de intoxicaciones o un doctor para obtener asistencia. Dar a sorber a la persona intoxicada un vaso de agua si está en capacidad de hacerlo. No inducir al vómito a no ser que lo aconseje el centro para el control de intoxicaciones o el doctor.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Aflójese las prendas de vestir y vigile la respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

# MODERADAMENTE PELIGROSO

# Fullmina™ 60 SL

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

### TÓXICO PARA EL GANADO.

Cuando se aplica en pastos, dejar un período de al menos 60 días libre de pastoreo.



### TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

### TÓXICO PARA ABEJAS Y AVES.

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Guatemala	479-71	24-08-2001
Belice	0093-8	12-12-1996
El Salvador	AG. 99-05-551	18-05-1999
Honduras	353-177-I	13-08-2001
Nicaragua	DW-004O-01-98	12-04-2004
Costa Rica	4461	28-01-2000
Panamá	1408	22-05-2001

# MODERADAMENTE PELIGROSO