

Impala™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butyronitrile	24 %
Ingredientes inertes	76 %
Total	100 %

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN.

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1.05 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



Para Centroamérica y Rep. Dominicana:

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC,
Helena Industries, 434 Fenn Road Cordele, GA, 31010, Estados Unidos.

Para Rep. Dominicana

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 # 96-41 Piso 7°. Bogotá, Colombia.

Impala™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

Impala™ 24 SC es un fungicida sistémico con propiedades protectoras, curativas y erradicantes. El ingrediente activo es absorbido por las hojas y es transportado en la planta hacia partes y áreas de crecimiento vía xilema. Actúa por inhibición de la demetilación del C14 en la biosíntesis del ergostero, impidiendo la biosíntesis del ergosterol. Es más eficaz en tratamientos preventivos. Su actividad puede durar hasta 1 mes.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual, de motor o aéreo y equipo adaptado a la toma de fuerza del tractor.

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua superficial y subterránea.

Asegúrese que las boquillas y empaques del equipo estén en buenas condiciones y que no goteen.

Utilice boquillas de cono hueco, calibre el equipo usando agua.

El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación con agua hasta la mitad del volumen a aplicar, mida exactamente la dosis de **Impala™ 24 SC** y agréguela, agite y complete el volumen de agua a usar. Para dosificar la cantidad correcta de producto debe utilizar una balanza o copa de medida. Si va a usar otros plaguicidas en mezcla debe realizar una pre-mezcla. Agite bien el producto en su envase previo a realizar la mezcla.



Impala™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS	CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Nicaragua y Panamá	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Añublo de la vaina <i>Rhizoctonia sp.</i>	0.75 - 1 L/ha	Utilice un volumen de aplicación, entre 100 y 200 L/ha para aplicaciones terrestres y de 20 galones para aplicaciones aéreas.
República Dominicana		Complejo de hongos del manchado de grano <i>Rhizoctonia sp.</i> <i>Helminthosporium oryzae</i>	0.6 - 0.8 L/ha	
Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana	Maíz <i>Zea mays</i>	Mancha de asfalto <i>Phyllachora maydis</i> <i>Monographella maydis</i> <i>Coniothyrium phyllachorae</i>	200-300 mL/ha (140-210 mL/mz)	Se recomienda realizar la aplicación en las primeras apariciones de <i>Phyllachora maydis</i> , con un máximo de 2 aplicaciones. El volumen de aplicación recomendado es de 300 L agua/ha (210 L/mz).
Guatemala Panamá Honduras	Banano y plátano <i>Musa spp</i>	Sigatoka <i>Mycosphaerella fijensis</i>	400 mL/ha	Se recomienda hacer las aplicaciones al inicio de la infección de la enfermedad para obtener los mejores resultados. Realizar un máximo de 6 aplicaciones por año. Aplicar cada 10 días.
República Dominicana	Banano <i>Musa spp</i>		500 mL/ha	Para banano, aplique en ciclos de 8 a 10 días. No aplique más de 8 ciclos por temporada. Iniciar el tratamiento con los primeros síntomas de la enfermedad (primeros focos). Es una excelente alternativa de rotación para utilizarse en un programa de aplicaciones y debe aplicarse al inicio de síntomas de la enfermedad (estadios, 1 y 2, de pizca a estrías).

ImpalaTM

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

INTERVALO DE APLICACIÓN:

En arroz realizar dos aplicaciones aproximadamente a los 45 y 75 días después de la siembra, cuando el cultivo está finalizando su ahijamiento (máximo macollamiento) y en su etapa reproductiva (máximo embuchamiento), en estas etapas donde hay mayor presencia de *Rhizoctonia* sp. y otros hongos.

En maíz aplique cada 14 días. No aplique más de 10 ciclos por temporada. Iniciar el tratamiento con los primeros síntomas de daño. En Rep. Dominicana para maíz, es recomendable realizar 2 aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días. Iniciar el tratamiento al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Para banano, aplique en ciclos de 8 a 10 días. No aplique más de 8 ciclos por temporada. Iniciar el tratamiento con los primeros síntomas de la enfermedad (primeros focos).

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para arroz 45 días. Para maíz 35 días. Banano: no hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

12 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. Se recomienda realizar una premezcla con los productos a utilizar. No es compatible con clorotalonil.

Impala™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacénese en un lugar fresco, seco y alejado del calor. Manténgalo en su envase original, debidamente cerrado con su panfleto, y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Esencialmente no es irritante para los ojos. Un breve contacto no es esencialmente irritante para la piel. No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. Las neblinas pueden producir irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta). La toxicidad por vía oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dar a la persona afectada un vaso de agua a sorbos, si es capaz de ingerir. No inducir al vómito, a menos que sea recomendado por el Instituto de Toxicología o por el médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Para

Rep. Dominicana: Suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar a un Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento.

POR INHALACIÓN: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, provea respiración artificial; si es de boca a boca use un protector (máscara de bolsillo, etc). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un doctor para obtener tratamiento.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica.	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones.	(502) 2232-0735
Belize	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983

Impala™

24 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOL FENBUCONAZOLE

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 689-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y

disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Guatemala	479-128	21-08-2015
El Salvador		
Honduras	613 -442-II	20-05-2016
Nicaragua	DW-05X-2015	3-12-2015
Costa Rica		
Panamá	7422	1-10-2015
República Dominicana	5311	02-11-2016